

EVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PELOUSES CALCICOLES

2025

2^{ème} année de suivi

Rapport version GRAND PUBLIC



Site Natura 2000
FR2600974

« Pelouses, forêts et
habitats à chauves-souris
du sud de la vallée de
l'Yonne et de ses affluents »

A photograph of a person wearing a cap and a dark shirt, standing in a field of tall, dry grass. The person is holding a clipboard and looking down at it. In the background, there is a dense line of green trees. A semi-transparent, light-colored rectangular box with rounded corners is overlaid on the lower half of the image, containing the text 'Évaluation de l'état de conservation des pelouses'. At the bottom center, the year '2025' is written in a large, white, sans-serif font.

Évaluation de l'état de conservation des pelouses


2025

En 2025, notre animatrice Natura 2000
a réalisé le **deuxième suivi de**
l'évaluation de l'état de
conservation des pelouses calcaires
du site, après un premier passage en
2020.

On vous explique de quoi il s'agit :
quels sont les indicateurs étudiés, les
principaux résultats et les enjeux.

—2020

—2025



7 indicateurs sont étudiés
tous les 5 ans
sur 20 pelouses calcaires
du site Natura Sud Yonne



Chaque pelouse obtient une note :

100 = état optimal, le top !


Entre 75 et 100 = bon état

Entre 60 et 75 = état altéré


En dessous de 60 = état dégradé




**Les RÉSULTATS
en 2025...**



6 pelouses
dans un BON ÉTAT



5 pelouses
dans un ÉTAT ALTERÉ



9 pelouses
dans un ÉTAT DÉGRADÉ




L'indicateur
de dégradation
des pelouses

LA COLONISATION ARBUSTIVE

A photograph showing a dense, lush green canopy of trees, likely plum trees, with a text overlay in the bottom left corner. The text is in French and describes the trees as spreading in a mat.

**Les prunelliers
qui s'étendent en nappe...**



**Des petits arbres variés,
mais tous au même stade...**


A photograph showing a dense stand of black pines (Pinus nigra) growing in a grassy field. The trees are tall and slender, with dark green needles. The ground is covered in green grass and some dry, yellowish vegetation. The sky is visible in the background, showing a clear blue color.

**Les pins noirs qui poussent
et envahissent tout l'espace**



Les RÉSULTATS

...



La note s'est dégradée
pour deux pelouses en 5 ans.
Elle reste stable pour les autres.

La longueur totale de recouvrement par cet indicateur est de 242 mètres, soit **14,5 % de la longueur prospectée**. Sur une pelouse, c'est jusqu'à 44 % de recouvrement.

L'indicateur est à surveiller de près et quand on peut entreprendre de la gestion pour le limiter, il ne faut pas hésiter !



L'indicateur
de dégradation
des pelouses

LES NOYAUX ARBUSTIFS

Il s'agit des **petits bosquets arbustifs ou parfois arborescents** que l'on peut rencontrer dans les pelouses.

Ces noyaux peuvent servir de **refuge pour la faune**. Trop présents, ils constituent un obstacle à l'expression de la biodiversité spécifique des pelouses en apportant trop d'ombre.



**Des genévriers associés
à d'autres arbustes...**




**De chênes isolés ou avec
quelques compagnons !**



Les RÉSULTATS

...



La note s'est améliorée sur 4
pelouses et dégradée sur 2.

À l'échelle du site, c'est mieux aussi !

Pour l'instant, **cet indicateur reste très peu détériorant** pour les pelouses étudiées (sauf pour une seule d'entre elles).



L'indicateur
de dégradation
des pelouses

**LES OURLETS :
DU BRACHYPODE,
MAIS PAS QUE !**

Un ourlet est un stade de transition entre 2 milieux naturels.

Ici, on étudie les ourlets des pelouses, c'est à dire **les espèces qui indiquent une évolution de la pelouse vers une forme moins sèche ou plus fermée.**



**Le Brachypode rupestre,
une graminée sociale qui
s'étend en nappe...**

A photograph of a lush green field with tall grass. Scattered throughout the grass are numerous small purple flowers and some small yellow flowers. In the lower right foreground, there is a prominent, dense cluster of purple flowers. The overall scene is a natural, wildflower meadow.

**Ici un joli ourlet à
Géranium sanguin...**



Le Brachypode
sur 95 % des pelouses



Le Gaillet mou
sur 75 % des pelouses



La Garance voyageuse
sur 65 % des pelouses



La Coronille bigarée
sur 55 % des pelouses

Et 21 autres espèces :

Origan

Genêt poilu

Dompte-venin

Buplèvre

Herbe aux cerfs

Clématite des haies

Libanotis

Aigemoine

Hélébore

Phalangère rameuse

Bétoine officinale

Mélampire


Mélitte à feuilles de Mélisse

...



Les RÉSULTATS

...



Toutes les pelouses sont dégradées
par les ourlets. La note s'est aggravée
pour 13 pelouses et pour le site



Les 2 seules dont la note
s'est améliorée
sont entretenues par écopâturage !

Les espèces des ourlets **recouvrent** 283 mètres du linéaire étudié, soit **plus de 17 % de la surface des pelouses.**

C'est **l'indicateur qui a le plus augmenté** depuis 2020. Un espoir toutefois est donné puisqu'il semble être bien **contrôlé par l'écopâturage.**



L'indicateur
de dégradation
des pelouses

LES ESPÈCES EUTROPHILES ET RUDÉRALES

Les espèces qui indiquent que l'homme est passé par là !

On les appelle les espèces
eutrophiles ou rudérales. Leur
présence peut modifier la qualité
écologique des pelouses.



**Les ronces,
présentes sur 9 pelouses**



La picride épervière...



Le Réséda jaune...



Le Marrube blanc...



La Pariétaire de Judée

Et 7 autres espèces :

La Carotte sauvage

Le Fromental

Le Cirse commun

La Fléole des prés


Les Laiterons

La laitue scariole



Les RÉSULTATS

...



La note s'est améliorée sur 5 pelouses et dégradée sur 2.



Les Rochers du Saussois
sont les plus touchés :

8 espèces au pied des falaises

En 2025, elles posent surtout problème sur notre **pelouse du Saussois**, très attractive pour les touristes et les amateurs d'escalade.

Toutefois, c'est seulement au pied des falaises qu'elles ont été observées et pour le moment, **elles ne remettent pas en cause la qualité écologique de la pelouse.**



L'indicateur
de dégradation
des pelouses

LES ESPÈCES ALLOCHTONES & ENVAHISSANTES

Les espèces **allochtones** sont les espèces **exotiques**. Elles ne sont pas toutes envahissantes.

Pour cet indicateur, **pas de comparaison possible avec 2020**, car la liste des espèces a été actualisée par les conservatoires botaniques nationaux.



**Des Mahonia,
qui nous inquiètent...**



**Un Cotonesaster horizontal,
qui s'étend doucement**



Un noyer, peu invasif



Les RÉSULTATS

...




3 espèces sur 3 pelouses,
à surveiller !



**Le pin noir est classé
“espèce exotique
envahissante”. Il est présent
sur 14 pelouses et problématique sur 2.**

L'Ailante



Le Robinier

Pour le moment
absentes des pelouses
étudiées mais **GRANDE VIGILANCE !**

Si la **présence** de certaines espèces **peut devenir catastrophiques pour les milieux naturels**, elle est **aussi problématique dans les jardins et les villes.**

Elles proviennent souvent des jardineries, alors **pensez à bien vous renseigner avant d'aménager vos plates bandes !**

Saviez-vous que **le pin**, par exemple, **peut devenir très envahissant et faire disparaître les pelouses sèches** en quelques années ?



L'indicateur
de dégradation
des pelouses

LES ALTÉRATIONS ET ATTEINTES

A photograph of a gravelly trail winding through a forest of tall evergreen trees. The trail is composed of light-colored gravel and small stones, interspersed with patches of green grass and low-lying vegetation. The trees are tall and thin, with dense green foliage. The overall scene is a natural, outdoor setting.

**Sentes de moto-cross ou
autres loisirs motorisés**



Dépôts sauvages...



**Tas de gravats
et autres matériaux**




**Surpiétinement (animal / humain),
Surfréquentation**



Les RÉSULTATS

...



La note s'est améliorée sur
5 entités et sur le site !

En 2025, **cet indicateur est très
peu dégradant sur les
pelouses** étudiées et nous en
sommes très contents !

Alors **continuons à veiller !**




L'état de conservation des pelouses

EPISODE 8




L'indicateur
de dégradation
des pelouses

LA SURFACE DE PELOUSE ET SON ÉVOLUTION



La surface

Il s'agit de la **surface totale** de pelouse à **laquelle on retire** les indicateurs suivants




Les noyaux arbustifs (épisode 3)


Les altérations (épisode 7)



La colonisation arbustive (épisode 4)



2020




2025

L'évolution
de la surface
On compare 2025 à 2020




Les RÉSULTATS

...



5 entités ont moins de 70 % de
surface de pelouse
(1 seule en 2020)



7 entités ont perdu 5 à 25 % de leur surface de pelouse
1 entité a gagné en surface !

Entre 2020 et 2025, **nos pelouses étudiées ont perdu 4,3 % de leur surface.**

Il reste toutefois 80 % de pelouses sur les entités en moyenne.



**Rendez-vous
dans 5 ans pour le
prochain suivi !!!**

En 2030, un nouveau passage
sera réalisé.

D'ici là, **nous agirons pour
améliorer l'état de
conservation** des pelouses,
notamment en luttant contre la
fermeture par
embroussaillement **grâce à
l'écopâturage** .

EVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PELOUSES CALCICOLES

2025

Retrouvez le rapport complet sur

sudyonne.n2000.fr



Site Natura 2000
FR2600974

« Pelouses, forêts et
habitats à chauves-souris
du sud de la vallée de
l'Yonne et de ses affluents »